



ÅRS-BERÄTTELSE
OM
BOTANISKA ARBETEN
OCH
UPPTÄCKTER
FÖR ÅR 1850

TILL
KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIEN
AFGIFVEN DEN 31 MARS 1851,

AF

JOH. EM. WIKSTRÖM.



STOCKHOLM, 1854.

P. A. NORSTEDT & SÖNER,
Kongl. Boktryckare

Uppställning af de i Sverige före- kommande arter af *Sparganium*.

AF

LARS LEWI LÆSTADIUS.

1. *Sparganium erectum* Linn.: fructibus maturis ovato-subulatis; stigmatibus linearibus; staminibus latitudine sua duplo longioribus.

a. simplex: foliis basi triquetris (erectis), lateribus planis; caule subsimplici; spicis masculis pluribus ¹⁾.

Denna varieté har sin nordliga gräns i Norra Ångermanland.

b. boreale: foliis basi triquetris et plano-convexis, natantibus; caule subsimplici; spicis masculis pluribus ²⁾.

Sp. natans *a.* Linn. Fl. Sv.

Denna varieté skulle efter bladens beskaffenhet blixa den egentligaste *Sp. natans* Linn.. Den är i Norrland den allmännaste af varieteterna i alla djupare vatten och elfvar. — De flytande bladen betäcka vatten-ytan såsom en tjock matta. — Har talrika han-ax, vanligen 5 eller 6, stundom 10 till 12. — På uttorkade ställen får denna växt bredare, nä-

¹⁾ *Sparganium simplex* *a. erectum* Beurling in *Öfversigt af Kongl. Wetenskaps-Academiens Förhandlingar*. 1852. s. 192.

²⁾ *Sparganium simplex* *b. natans* Beurling in *Öfversigt af Kongl. Wetenskaps-Academiens Förhandlingar*. 1852. s. 192.

stan svärdslika och upprättstående blad, och liknar då *Sp. simplex*. Det var denna form, som Linné fann i Lappmarken och i Flora Suecica hämförde till sin *Sparg. erectum*. — I de nordligaste trakterna blommar Växten ej alla år, emedan sommaren ofta är kall, regnig och kört.

γ. glomeratum: foliis erectis, triquetris; caule simplici; spiculis semineis glomeratis; stigmate linearis-abbreviato; spica mascula solitaria, sessili³⁾.

Denna varieté har *hon-axen* tätt gytttrade i toppen af stjälken, ofta 4, utom ett *han-ax*, som är fästdadt på översta hon-axet. De mogna frukterna äro spetsiga, och så sammanflytande med *stiftet*, att detta *stift* blifver lika med o. — Märket är ganska kort, men jemnbredt. — Vid Hernösand anmärktes denna varieté år 1843 i kall-källdrag.

δ. ramosum: caule ramoso; spicis masculis pluribus; foliis triquetris (lateribus concavis), erectis⁴⁾.

För mig synes, att *Sparg. ramosum* är en luxurierande form af *Sparg. simplex*. Exemplar af *Sparg. ramosum* ifrån södra Sverige visa ingen väsendlig skillnad. Det i Ångermanland fundna så kallade *Sparg. ramosum* kan jag ej skilja ifrån *Sparg. simplex*.

2. *Sparganium natans* Linn.: fructibus junioribus subulatis, maturis ovatis obtusiusculis; stigmatibus oblongis; spica mascula subsolitaria.

α.

³⁾ *Sparganium glomeratum* Beurling in Ofversigt af Kongl. Wetenskaps-Academiens Förhandlingar. 1852. s. 192.

⁴⁾ *Sparganium ramosum* Linn. a. *erectum* Beurling in Ofversigt af Kongl. Wetenskaps-Academiens Förhandlingar. 1852. s. 192.

- α. subdecumbens*: foliis natantibus planis⁴).
β. suberectum: caule erecto; foliis erectis planis⁵).
Sp. natans *β. minimum* Linn.
Sp. natans plur. recentiorum.

Denna varieté (*Sp. natans* *β. suberectum*) är allmän i medlersta och i södra Sverige, men sällsynt i det norra. Den är anmärkt vid Gefle och vid Hernösand, hvarest den äfven fanns i samma kall-källdrag, i hvilket *Sparg. erectum* *γ. glomeratum* växte; i Pajala Socken i Westerbotten; i Lappmarken såg Linné den i Åsele.

De unga frukt-ämnenä äro spetsiga eller syllika med ett kort stift.

3. *Sparganium hyperboreum* Læstad.: fructibus junioribus et maturis ovatis, obtuse-triquetris, obtusis; stylo nullo; stigmate ovato; spica mascula solitaria; foliis decumbentibus et natantibus planis.

- Sp. natans* Wahlenb. Fl. Lapp. — *Sp. natans* *β. submuticum* Hartm. Scand. Fl. Edit. 4 & 5.
α. inundatum: caule foliisque elongatis angustatis¹).

Hab. in fossis nunquam exsiccatis.

⁴⁾ *Sparganium minimum* Fries. *β. natans*. Beurling in Öfversigt af Kongl. Wetenskaps-Academiens Förhandlingar. 1852. s. 192.

Fructificans (biunaris et ultra) occurrit in lacu Rättar-Dammen prope Drottningholm Uplandiæ, et verosimiliter identicum est cum forma illa longifolia sterili in lacubus prope Upsaliæ obvia, quæ a Doctore Ångström in Dario" Botaniska Notiser 1853. s. 148" commemoratur.

⁵⁾ *Sparganium minimum* Fries *α. suberectum* Beurling in Öfversigt af Kongl. Wetenskaps-Academiens Förhandlingar. 1852. s. 192. — In Lapponia Umensi (D:r Ångström).

¹⁾ *Sparganium hyperboreum* Læstadii. *β. natans* Beurling in Öfversigt af Kongl. Wetenskaps-Academiens Förhandlingar 1852. s. 192.

$\beta.$ caule spithameo; foliis latiusculis ⁶).

Hab. in paludibus et lacunis exsiccatis.

Sparganium hyperboreum är allmänt i Sveriges nordligare trakter: i Lappmarkerna och i Norrland, i alla kärr och pölar, som snart uttorka; äfven i små bäckar i Ångermanland, och troligen i alla de Landskap, hvilka gränsa intill fjell-ryggen. Huru långt det förekommer söder ut i Sverige är mig obekant. — Denna art växer stundom blandad med *Sparg. erectum*. $\beta.$ *boreale*, men utan tecken till öfvergångar emellan dem. Hela växten är späd. — *Frukt-Ämnena* äro redan under blomningen trubbigt-trekantiga med ovalt märke utan stift. *Ständar-Knapparna* äro ågggrunda. Om denna art växer i djupare vatten än en aln, så blommar den ej ⁷).

⁶) *Sparganium hyperboreum* Læstadii. $\alpha.$ *erectum* Beurling in Öfversigt af Kongl. Wetenskaps-Academiens Förhandlingar 1852. s. 192.

⁷) Forte *Sparganium hyperboreum* planta est illa a Cel. Fries (in libro: "Botaniska Utslygter" 1:sta Delen. 2:dra Uppl. s. 271.) sub nomine *Spaganii angustifolii* Michauxii commemorata.

Nomen a Rev. Læstadio datum, *Sparganium hyperboreum*, certissimum; alterum, *Sparganium angustifolium* Mich., adhuc ambiguum, non solum Rob. Brownio verum etiam Kunthio dubium et plerisque Botanicis ignotum.

Sparganium angustifolium R. Brownii e Nova Hollandia specifice verosimiliter differt.

Incertum etiam est, an *Sparganium americanum* Nutt. eadem sit species ac *Sparganium angustifolium* Michauxii.

