

BESKRIFNING
öfver några sällsyntare växter från
norra delarne af Sverige, jemte an-
märkningar i Växt-Geographien;

af

L. L. LÆSTADIUS.

(Fortsättning, fr. K. V. A. Handl. för år 1824.)

§. 5.

SAXIFRAGA *Cotyledon* var. *maculata*.

Hab. saxis apertis alpium rarius. Legi in summo alpium Pitensium jugo inter Mavasjaur et Ballaur anno 1825.

Inter varietatem hanc et ipsam *S. Cotyledonem* nullam præcipuam indagare potui differentiam, præter quod minoris illa evasit staturæ utpote summis alpibus nata. Ceterum latera petalorum interna irregulariter, sed tamen eleganter purpureo maculata.

SAXIFRAGA *Cotyledon* var. *glabrata*: scapo simplici; panicula florifera ferme fastigiata; calyce glabratō, fructuque semisupero, foliis lindulatis glaucescentibus.

Hab. saxis apertis vento expositis summo Alpium jugo rarius. Legi semel in Nordlandia inter lacus Ballaur et Mavasjaur, anno 1825.

Radix fissuris rupium inhærens inferne filiformis atque brevis est; superne autem ramosa cespites complures emittens foliaceos atque conglomeratos, quorum ex centro scapus surgit digitalis vel spithamæus semper fere simplex et squamis foliaceis ornatus. Panicula approximata subfastigiata floribus campanulatis intus purpureo maculatis. Pedicelli quidem glandulosi hirtelli, sed calyx semper glaberrimus quam ob rem hæc aliquanto magis differt a *Saxifr.* *Cotyledone*, quam varietas præcedens.

RANUNCULUS Auricomus var. *alpestris*: foliis radicalibus usque ad basin quinquepartitis; foliolis cuneiformibus trilobis; caule procumbente.

Hab. in stillicidiis alpium Pitensium. Duplo minor hic est illo, qui in Svecia australiori inveniri solet. Calyces vero et petali qui ni atque perfecti nec decidui, antequam matrrescit fructus.

HIERACIUM alpinum var. *fuliginosum*: caule inferne ramoso; stigmatibus nigro-virescentibus.

Hab. campis graminosis alpium Pitensium frequenter.

Duplo major hæc est varietas, quam ipsum *H. alpinum*, quamvis gracilis et laxa.

Folia radicalia pauca, linear-lanceolata. Rami aliquot ex parte caulis inferiore erumpunt; sæpe tamen simplex est scapus atque uniflorus. Qvare *H. alpino* magis propinquum mihi esse videtur, quam *H. murosum*. Color autem stigmatum semper atrovirens est, quum stigmata *H. alpini* omnino flavi evadunt.

§. 6.

Ehuru de högre fjelltrakterna af Piteå Lappmark, hvilka jag försökt den sommar 1825 haft

tillfälle att närmare undersöka, icke allenast hysa de allmänna fjellväxterne, utan äfven flera sällsyntare; så äro de likval i allmanhet icke af en så ryslig natur som de i Luleå Lappmark; ej heller har jag på något ställe i Piteå Lappmark funnit en så rik och concentrerad vegetation, som vid stränderne af Virihjaur i Luleå Lappmark. I Piteå Lappmark är bergsbildningen i allmänhet mera jemn och medelmättig, när man undantager några högre bergsspetsar, såsom de 3 Saulo fjellen, Opakajse, hvilket likväl icke ligger inom Svenska gränsen; Tjidtjak, samt de högre fjellen på södra sidan af Lais Elfven.

Dessutom träffas inga större glacierer inom gränsen af Piteå Lappmark när man undantager de redan bekanta, som stöta intill Sulitelma och de öfrige i Luleå Lappmark bekanta isfälten.

Emedlertid träffas äfven i Piteå Lappmark åtskilliga fjell, hvilka hysa en både rik och sallsynt vegetation. Sådane äro den berghs-ås, som ligger mellan Mavasjaur, samt det så kallade Ballaur eller Ballvatnet, af hvilka Sjöar den förra utgör ursprunget till södra grenen af Piteå Elf, och den sednare flyter till Norrska Hafvet. Ett fjell vid namn Acharis på norra sidan af Mavasjaur är äfven ganska växtrikt. Jemte Svaipa-fjellen på södra sidan af Lais Elfven, är äfven Ferropuold anmarkningsvärdt för sin tidiga och rika vegetation. Med afseende på dessa anmärkningar vill jag här anföra några växtställen på sällsyntare växter, som finnas inom Piteå Lappmark samt deremot svarande fjell på Norrska sidan, till jämförelse med Luleå Lappmark.

Kobresia scirpina, Acharis samt flera ställen norr om Piteå Elf.

Alopecurus pratensis; Adolphström, samt flera ställen i Piteå Lappmark vid skogsbyrnet.

Agrostis algida, fans på flera ställen i norr-ska Nordlanden på södra och norra sidan om Saltdalen, på södra sidan af Ballvattnet m. fl. Denna märkvärdiga gräsart växer endast vid de högre fjellkullarne på en af snö-vatten beständigt öfversvämmad gäs-lera, som föröfrigt är ganska mager och nästan otillganglig för all annan vegetation; den är dessutom ganska svår att upptäcka, emedan den knappt tums långa vaxien nedtryckes mot jordytan af det öfverströmmande vattnet. Man kan äfven icke neka, att detta gräs är något olikt de vanliga Agrostis-arterne, till hvilka det blifvit hänsördt. Jag har oaktadt förenyad examincering med flera exemplar på de nämde växtställen icke kunnat upptäcka mer än 2:ne ständare, deremot har jag hos flera fullkomligare exemplar, utom de af andra auctorer observerade foderskalen, äfven funnit ett par smärre foderskal, hvilka till hälften omgivna de förra. Det af Hr D:r WAHLENBERG omtalade enskilda kronskälet, som omgiver basen af kärnan, har jag icke markt hos de exemplar, som blifvit tagne i Piteå Lappmark. Om nu de 2:ne ständarne och de 2:ne ytterre foderskalen kunna anses som en abnormitet hos växten efter olika växtställen; det lemnas till kännares vidare undersökning. Sjelfva växten kunde likväl efter de nyares mångdubblings system utgöra ett från Agrostis skiljdt genus.

Aira atropurpurea, norr om Ballvattnet i Nordlanden temligen ymnigt; dessutom allmän på de lägre fjellen i Piteå Lappmark i synner-

het på våtländ mark omkring skogsbynet.

Galium svaveolens ymnig i Saltdalen.

Campanula uniflora; ymnig vid fjellet Acharis.

Gentiana glacialis, Acharis ymnig.

Juncus arcticus på flera ställen inom Piteå Lappmark, samt sydligast vid Kåbdespakte ofvan Randalen.

Andromeda tetragona; på norra sidan af Saltdalen vid Ballvattnet.

Af Saxifrager finnas i Piteå Lappmark: oppositifolia, nivalis, stellaris, aizoides, cernua, rivularis, cæspitosa.

Alsine stricta på flera ställen.

Sedum villosum fans temligen ymnigt på den landt-rygg, som är emellan Ballvattnet och Mavasjaur, dock icke inom gränsen af Piteå Lappmark.

Lychnis apetala, Nordl. på södra sidan af Ballvattnet. *Potentilla nivea* vid Acharis.

Ranunculus nivalis, *glacialis* och *pygmaeus* allm.

Pedicularis hirsuta; Kåbdespakte ofvan Randalen.

Draba alpina, Acharis; *Draba muricella* allm. *D. androsacea* Kåbdespakte.

Phaca frigida vid södra Saulo ofvan Saltdalen. *Phaca lapponica* på södra och norra sidan af Saltdalen, samt äfven vid Acharis i Piteå Lappmark.

Astragalus oroboides; sparsamt på södra och norra sidan af Saltdalen.

Arnica alpina; sparsamt vid ett fjell kalladt Kåbre-aiwe i Piteå Lappmark nära Lais Elf.

Orchis albida; norr om Randalen.

Ophrys alpina; flerstädes på norra och södra sidan om Saltdalen, samt äfven inom Piteå Lappmarks gräns.

Carex rupestris; vid Acharis, Kåbdespakte ofvan Randalen, samt flera ställen inom Piteå Lappmark.

Carex ustulata; vid Ballvattnet, Acharis samt flera ställen.

Carex pedata; vid Stormdals Elf i Ran., samt flerstädes äfven vid Acharis. *Carex atrata*; flerstädes. *Carex limosa* var. *rarisflora* vid Ballvattnet. *Salix polaris* vid Kåbdespakte ofvan Ran. Föröfrigt finnas i Piteå Lappmark alla allmänna fjellvexter.
